Table 10.6e
Immunosuppression Use for Maintenance
Prior to Discharge, 1996 to 2005
Recipients with Intestine Transplants

	Year of Transplant									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Functioning Graft at Discharge	35	45	47	49	61	88	89	103	130	153
With Immunosuppression Info	24	44	47	49	61	88	89	103	127	149
Corticosteroids										
Any in Category	100.0%	97.7%	100.0%	93.9%	96.7%	79.5%	64.0%	67.0%	74.8%	72.5%
Steroids	100.0%	97.7%	100.0%	93.9%	96.7%	79.5%	64.0%	67.0%	74.8%	72.5%
Cyclosporine										
Any in Category	0.0%	2.3%	8.5%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
Sandimmmune	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Neoral	0.0%	2.3%	4.3%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
Tacrolimus										
Any in Category	91.7%	95.5%	91.5%	95.9%	95.1%	97.7%	95.5%	93.2%	97.6%	96.6%
Tacrolimus	91.7%	95.5%	91.5%	95.9%	95.1%	97.7%	95.5%	93.2%	97.6%	96.6%
Antimetabolites										
Any in Category	58.3%	52.3%	36.2%	24.5%	21.3%	10.2%	12.4%	8.7%	9.4%	11.4%
Mycophenolate Mofetil	37.5%	40.9%	29.8%	18.4%	14.8%	3.4%	12.4%	8.7%	9.4%	11.4%
Azathioprine	20.8%	11.4%	6.4%	6.1%	6.6%	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cytoxan	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
mTOR Inhibitors										
Any in Category	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	39.3%	21.6%	19.1%	5.8%	11.8%	12.1%
Sirolimus	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	39.3%	21.6%	19.1%	5.8%	11.8%	12.1%
Everolimus	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Source: OPTN/SRTR Data as of May 1, 2006.
Notes:
Individual drug percentages will not necessarily add up to the drug category percentages, as patients may be prescribed more than one drug within the same category.