Table 10.6a
Immunosuppression Use for Induction, 1996 to 2005
Recipients with Intestine Transplants

	Year of Transplant									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Transplants	45	68	70	73	82	112	107	116	152	176
With Immunosuppression Info	33	66	68	71	80	112	106	116	149	164
Induction Drugs										
ALG	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Atgam/NRATG/NRATS	3.0%	3.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.9%	1.7%	2.7%	1.8%
OKT3	12.1%	4.5%	2.9%	9.9%	5.0%	7.1%	1.9%	1.7%	0.7%	3.7%
Thymoglobulin	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	12.5%	31.1%	45.7%	18.8%	15.2%
Zenapax	0.0%	0.0%	36.8%	49.3%	55.0%	23.2%	10.4%	16.4%	8.7%	14.0%
Simulect	0.0%	0.0%	1.5%	1.4%	12.5%	13.4%	13.2%	1.7%	0.7%	3.0%
Campath	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	18.8%	22.6%
No Induction Drugs Recorded	84.8%	92.4%	58.8%	39.4%	31.3%	43.8%	42.5%	25.9%	49.7%	45.7%

Source: OPTN/SRTR Data as of May 1, 2006.
Notes:
Induction drugs include any reported antilymphocyte antibodies and antibodies directed against lymphocyte receptors.